



TB-MEDIKASIE VIR KINDERS: MAKLIKE DOSISGIDS IN 3 MAKLIKE STAPPE



! JY SAL KRY

RHZ (75/50/150)


en Ethambutol (400mg)



RHZ
(75/50/150)

Rifampicin + Isoniazid +
Pyrazinamide (RHZ) is 'n tablet
wat maklik in water oplos.

+



E
(400MG)



Ethambutol is 'n tablet wat jy
kan fynmaak en met water meng.

Jy moet albei die medisyne voorberei en
albei medisyne elke dag vir jou kind gee (selfs
oor naweke!). Na 2 maande sal jou kind se
medikasie verander. Jou kind sal die medisyne
vir 'n totaal van 4 tot 6 maande gebruik.

* NOTA

KAN JOU KIND TABLETTE SLUK?

Leer jou kind om tablette heel of in
helftes te sluk. As jou kind nie kan
tablette kan sluk nie, druk dit fyn en
meng met water.



Gee die medikasie op 'n leë maag as dit moontlik is, maar dit kan saam
met kos ook geneem word.

STEP

1

**JOU
VERPLEEG-
STER SAL
JOU KIND
SE GEWIG
KYK**



STEP

2

**JOU KIND
SE GEWIG
SAL TEEN DIE
DOSISGIDS
GEKYK
WORD**



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Gates Foundation




THINKTANK



TB-MEDIKASIE VIR KINDERS:

HOE OM DIT FYN TE MAAK, TE MENG EN TOE TE DIEN




ETHAMBUTOL (400mg)

Maak gereed!

Jy sal nodig hê:

- 1 spuit (om te meet)
- skoon water
- 2 skoon lepels
- 1 ethambutol-tablet 400 mg


1 Druk die tablet fyn
Plaas 1 tablet in 'n lepel.
Druk dit fyn met 'n ander
lepel totdat dit poeier is.




2 Voeg water by
Gebruik 'n spuit om
8 ml water te meet.
Voeg dit by die glas.





3 Meng goed
Roer die
fyngemaakte tablet
en die water.




4 Meet die regte dosis
Gebruik die spuit
om die hoeveelheid
volgens jou kind se
kaart op te trek.



5 Dien die medisyne toe met
die spuit.




6 Gooi enige oorblywende
mengsel weg.



RHZ (75/50/150)

Meng RHZ in 5-10ml
water (Die tablette
meng maklike in die
water)



5-10ml

Los in water
op; gooi enige
medisyne wat
oorbly weg ná
toediening.

! ONTHOU



Gee die medisyne
elke dag op
dieselfde tyd.



Was altyd
hande en
eetgerei.



Na 2 maande sal die
verpleegkundige vir jou
ander behandeling gee
om die 4-tot-6-maande
behandeling te voltooi.



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Gates Foundation



THINKTANK



STEP

3

VOLG DIE

DOSERING-

ING-

SKAART

TB-MEDIKASIE


VIR KINDERS:






















VERSORGER:

GEBRUIK

HIERDIE GIDS OM JOU KIND SE

DOSIS TE VOORBEREI



	RHZ (75/50/150)	ETHAMBUTOL (400MG)
Medikasie	 Slik heel in OF los die tablet in water op.	 Sluk heel in OF fyngemaal en gemeng in 8 ml water.
Kind se gewig	Vir kinders minder as 2 kg, praat asseblief met 'n kenner.	
2 – 2.9 kg	 Meng ½ tablet in 5 ml water. 	 Gebruik slegs 1ml uit jou 8ml mengsel. Gooi die res weg.
3 – 3.9 kg	 Meng die tablet in 4ml water. Gee slegs 3ml. Gooi die res weg.	 Gebruik slegs 1,5ml uit jou 8ml mengsel. Gooi die res weg.
4 – 7.9 kg	 Meng 1 tablet in 5ml water. 	 Gebruik slegs 2,5ml uit jou 8ml mengsel Gooi die res weg.
8 – 11.9 kg	 Gee 2 tablette vir jou kind om te sluk OF meng in 10 ml water. 	 Gee ½ tablet om te sluk OF gebruik net 4ml uit die 8ml mengsel. Gooi die res weg.
12 – 15.9 kg	 Gee 3 tablette om te sluk OF meng in 10 ml water. 	 Gebruik slegs 6ml uit jou 8ml mengsel. Gooi die res weg.
16 – 24.9 kg	 Gee 4 tablette om te sluk OF meng in 10 ml water. 	 Gee 1 tablet om te sluk OF gebruik al 8ml van jou mengsel. 
Vir kinders swaarder as 25 kg	 RHZE Dit is één tablet met al vier middels. Sluk die tablette heel met water. Volg die doseringsgids hieronder.	
25 – 29.9 kg	 2 tablette	
30 – 34.9 kg	 3 tablette	
35 – 64.9 kg	 4 tablette	
65 kg en swaarder	 5 tablette	